

Khi nào Trẻ Em và Thiếu Niên Cần Chủng Ngừa?

Tuổi	HepB Viêm gan B	DTaP/Tdap Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà (ho rít)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> loại b	IPV Polio (Sốt Tê Liệt)	PCV13 Khuẩn cầu phối tiếp hợp	RV Rotavirus	MMR Sởi, quai bị, sởi Đức	Varicella Thủy đậu	HepA Viêm gan A	HPV Siêu vi papillomavirus ở người	MCV4 Khuẩn cầu não Tiếp hợp	Influenza Cúm (Flu)	
Mới sinh	✓												
2 tháng	✓ (1-2 tháng)	✓	✓	✓	✓	✓							
4 tháng	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓							
6 tháng	✓ (6-18 tháng)	✓	✓ ¹	✓ (6-18 tháng)	✓	✓ ¹	✓ (12-15 tháng)	✓ (12-15 tháng)	✓✓ (chủng 2 liều cách 6 tháng vào lúc 12-23 tháng)			✓ (Chủng một liều mỗi mùa thu hoặc mùa đông cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Một số trẻ em dưới 9 tuổi có thể cần 2 liều; hỏi chuyên viên chăm sóc y tế của con quy vị xem em có cần nhiều hơn 1 liều hay không.)	
12 tháng		✓ ² (15-18 tháng)	✓ (12-15 tháng)		✓ (12-15 tháng)								
15 tháng													
18 tháng													
19-23 tháng	Theo Kíp ³	Theo Kíp ³	Theo Kíp ³	Theo Kíp ³	Theo Kíp ³		Theo Kíp ³	Theo Kíp ³					
4-6 năm		✓		✓			✓	✓					
7-10 năm		Theo Kíp ³											
11-12 năm		✓ (Tdap)			Theo Kíp ³			Theo Kíp ³	Theo Kíp ³	Theo Kíp ³	✓✓✓	✓	
13-15 năm		Theo Kíp ³ (Tdap)								Theo Kíp ³		Theo Kíp ³	
16-18 năm										Theo Kíp ³		✓	

GHI CHÚ

- Em bé của quý vị có thể không cần liều này tùy thuộc vào loại thuốc chủng mà chuyên viên chăm sóc y tế của quý vị sử dụng.
- Liều DTaP này có thể chủng sớm vào lúc 12 tháng tuổi nếu liều trước đó đã chủng được 6 tháng.

- Nếu các đợt chủng ngừa của con quý vị bị trễ quá hạn hoặc bỏ sót, hãy cho con chủng ngừa bổ sung càng sớm càng tốt. Nếu con quý vị vẫn chưa hoàn tất một loạt chủng ngừa đúng hạn, em sẽ chỉ cần chủng những lần còn lại trong loạt đó. Không cần bắt đầu lại từ đầu.